

## INFORMACIJE O PROIZVODU

### **Naziv proizvoda**

Mentotym traka

Pomoćno medicinsko sredstvo za pčele

### **Sastav proizvoda**

1 kom trake (51 g) sadržava:

timol 4 g

ulje paprene metvice 2 g

Adjuvansi i pomoćne tvari 51 g

### **Ciljne vrste životinja**

Pčela medarica (*Apis mellifera L.*)

### **Kratak opis područja primjene proizvoda, uputa za upotrebu, indikacije**

Proizvod se koristi za suzbijanje varooze prouzrokovane grinjom varoa (*Varroa destructor*), te kao pomoćna terapija protiv zaraze trahealnom grinjom (*Acaparis woodi*). Ako ga primjenjujemo u vremenu zimovanja zajednica pomaže varoozu držati na niskoj razini. Pomaže prihvaćenje novih matica u zajednicama.

### **Doziranje i način primjene**

Koristi se unutar košnice.

Vrećicu je slobodno otvoriti prije samog tretiranja. Izvadite iz vrećice traku i zatim je položite okomito na vrh okvira i iznad ležišta.

U nastavljači trake se uvijek moraju položiti na najgornje okvire plodišta. Mogućnost kretanja zraka oko traka treba se omogućiti, tako da se one ne smiju pokriti u cijelosti. U slučaju pokrivanja folijom iz cilja da bude razmak između traka i folije se treba staviti razmagnica između okvira i folije.

Količina traka koje želimo upotrijebiti minimalno je jedna i najviše tri, koju određuje vrsta košnice i veličina zajednice. Trake se trebaju u košnici ostaviti 45 dana. Tokom tretiranja broj otvaranja košnica i vrijeme treba se minimalizirati da bi se koncentracija sastava što bolje održala.

Istodobno treba tretirati sve zajednice na pčelinjaku.

### **Doziranje u slučaju zarazom varooze i akaroze:**

#### **U slučaju NB košnice:**

- |  |         |
|--|---------|
| • u slučaju zajednice koja ima 4 zaposjednute ulice            | 1 traka |
| • u slučaju zajednice koja ima 8 zaposjednutih ulica           | 2 trake |
| • u slučaju zajednice koja ima 12 ili više zaposjednutih ulica | 3 trake |

#### **U slučaju Hunor košnice nastavljače:**

- |   |         |
|---|---------|
| • U slučaju plodišta s jednim nastavkom   | 1 traka |
| • U slučaju plodišta s jednim nastavkom i medišta s jednim nastavkom<br>(Na prvi nastavak i njegove okvire položiti trake na vrh) | 2 trake |
| • 2 nastavka s plodištem bez medišta<br>(Na drugi nastavak i njegove okvire položiti trake na vrh)                                | 2 trake |
| • U slučaju plodišta s dva nastavka i medišta s jednim nastavkom<br>(Na drugi nastavak i njegove okvire položiti trake na vrh)    | 3 trake |

**U slučaju ½ NB košnice nastavljače:**

- |   |         |
|---|---------|
| • U slučaju plodišta s jednim nastavkom   | 1 traka |
| • U slučaju plodišta s jednim nastavkom i medišta s jednim nastavkom<br>(Na prvi nastavak i njegove okvire položiti trake na vrh) | 1 traka |
| • 2 nastavka s plodištem bez medišta<br>(Na drugi nastavak i njegove okvire položiti trake na vrh)                                | 2 trake |
| • U slučaju plodišta s dva nastavka i medištem s jednim nastavkom<br>(Na drugi nastavak i njegove okvire položiti trake na vrh)   | 2 trake |

\*Pod izrazom medište što je bitno s gledišta doziranja misli se na nastavak koji je dobro opskrblijen pčelama i medom. U slučaju ako se može naći malo meda i pčela u nastavku medišta, onda kao da ga i nema.

**Doziranje u slučaju zimovanja:**

- 1 komad trake u slučaju male zajednice
- 2 komada trake u slučaju velike zajednice

Trake se trebaju odstraniti prilikom prvog proljetnog pregleda.

**Doziranje u slučaju zamjenje i dodavanja matice:**

- Prilikom stvaranja nove zajednice treba se položiti 1 komad trake.
- U slučaju već kod razvijene zajednice treba se položiti 2 komada trake.

Trake se trebaju ostaviti u košnici 45 dana.

**Kontraindikacije**

Primjena proizvoda tokom paše se ne preporučuje, jer mijenja okus meda.

**Nuspojave:**

Poslije tretiranja kod zajednica može se pojaviti blagi nemir.

**Rok valjanosti**

Rok valjanosti pomoćno medicinsko sredstvo kad je zapakiran za prodaju: 3 godine.

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja unutarnjeg pakovanja: odmah primijeniti.

**Posebne mjere pri čuvanju**

Čuvati pri temperaturi do 30°C.

Nemojte držati u hladnjaku. Čuvati od zamrzavanja.

Čuvati u originalnom pakovanju, na suhom mjestu.

Zaštiti od direktnog sunčevog svjetla.

**Pakovanje**

6 komada, pojedinačno pakirana u troslojnu (PET/AL/PET PPHC) vrećicu, u papirnoj kutiji. Smije se otvoriti.

**Samo za primjenu na životinjama! Čuvati izvan pogleda i dohvata djece!**

**Posebne mjere opreza prilikom odlaganja neupotrebljenog proizvoda ili otpadnih materijala**

Neupotrebljeno pomoćno medicinsko sredstvo, te nastali otpadni materijal treba se poništiti prema mjesnim propisima.

Proizvođač: Primavet-Sofia Ltd, Herakovo, Bojuriste 2211 Sofija, Bugarska

Distributer: EURO-VET Zöldsziget Kft. 7500 Nagyatád, Petőfi Sándor u. 24.

Tel.: +36-82/454-413; Fax.: +36-82/553-180; [zoldsziget.euro-vet.hu](mailto:zoldsziget.euro-vet.hu); [zoldsziget@euro-vet.hu](mailto:zoldsziget@euro-vet.hu)

Registracijski broj proizvoda: 069/1/2010 MgSzH ÁTI