

Produktinformationen

Bezeichnung der Produktion

Mentotym Streifen

Paramedizin Produkt für Honigbienen

Wirkstoffe und sonstige Bestandteile

1 St. Streifen (51 g) enthält:

Thymol	4 g
Pfefferminzöl	2 g
Sonstige Bestandteile ad	51 g

Zieltierart(en)

Honigbiene (*Apis mellifera* L.)

Anwendungsgebiete

Zur Behandlung der Varroose (*Varroa destructor*) bei Honigbienen (*Apis mellifera*) und zur Behandlung die Erkrankung der erwachsenen Bienen mit der Tracheenmilbe (*Acarapis woodi*). Das Arzneimittel kann die Varroose an kleine Stufe halten, wenn die Bienen sind überwintert. Die Völker können besser akzeptieren die neue Bienenkönigin mit der Hilfe von dieser Produktion.

Dosierungen für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Sie müssen die Tasche direkt von die Behandlung öffnen. Nehmen Sie den imprägnierten Streifen aus dem Paket, und setzen Sie die Streifen senkrecht an dem Wabenhalterungsrahmens von der oberen Brutraumzarge.

Sie müssen die Streifen in einer Magazinbeute immer an dem Wabenhalterungsrahmens ober der Brutraumzarge setzen. Sie müssen die Ventilationen immer garantieren, deswegen dürfen Sie die Streifen nicht abdecken. Wenn es ein Cover mit Folio ist, müssen Sie die Abstandhalter einsetzen; und Sie müssen diese Abstandhaltern neben die Streifen setzen.

Sie müssen Minimum eine, Maximum drei Streifen setzen in der Bienenstock, aber Sie müssen die Stücken nach dem Gebrauchsinformation in dem Bienenstock setzen, aber Sie müssen die Streifen vor 45 Tagen dort lagern.

Die Öffnungsnummer und Zeit von einem Bienenstock müssen Sie an kleine Stufe halten, weil Sie die Wirkstoffe-Konzentration instand halten müssen.

Alle Völker eines Bienenstandes sollten gleichzeitig behandelt werden.

Dosierungen bei der Behandlung der Varroose und die Tracheenmilbe :

NB Bienenstock :

- wenn die Völker füllen mindestens 4 Wabengassen aus 1 Streife
- wenn die Völker füllen mindestens 8 Wabengassen aus 2 Streifen
- wenn die Völker füllen 12 oder mehr Wabengassen aus 3 Streifen

Hunor Bienenstock:

- wenn es ist eine Brutraumzarge 1 Streife
- wenn es ist eine Brutraumzarge und eine Honigraumzarge* 2 Streifen
(Setzen Sie die Streifen an dem Wabenhalterungsrahmens von der erste Zarge.)
- wenn es ist zwei Brutraumzargen, aber keine Honigraumzarge 2 Streifen
(Setzen Sie die Streifen an dem Wabenhalterungsrahmens von der zweite Zarge.)
- wenn es ist zwei Brutraumzargen, und eine Honigraumzarge* 3 Streifen
Setzen Sie die Streifen an dem Wabenhalterungsrahmens von der zweite Zarge.)

½ nB Bienenstock:

- wenn es ist eine Brutraumzarge 1 Streife
- wenn es ist eine Brutraumzarge und eine Honigraumzarge* 1 Streife
(Setzen Sie die Streifen an dem Wabenhalterungsrahmens von der erste Zarge.)
- wenn es ist zwei Brutraumzargen, aber keine Honigraumzarge 2 Streifen
(Setzen Sie die Streifen an dem Wabenhalterungsrahmens von der zweite Zarge.)
- wenn es ist zwei Brutraumzargen, und eine Honigraumzarge* 2 Streifen
(Setzen Sie die Streifen an dem Wabenhalterungsrahmens von der zweite Zarge.)

* Die Honigraumzarge ist (während die Dosierungen) eine Zarge mit viele Völker und Honig. Aber wenn es ist nur wenige Völker und Honig in der Honigraumzarge, dann müssen Sie diese Zarge nicht berücksichtigen.

Dosierung während der Überwinterung:

- 1 Streife für kleine Völker
- 2 Streifen für große Völker

Sie müssen die Streifen bei der ersten Prüfung im Frühling ausnehmen.

Dosierung wenn es die Königin zusetzt ist:

- Sie müssen eine Streife in dem Bienenstock setzen, wenn Sie ein neues Bienenvolk erstellen.
- Wenn Sie ein erwachsenes Volk haben, dann müssen Sie zwei Streifen in dem Bienenstock setzen.

Gegenanzeigen

Das Tierarzneimittel darf nicht während der Tracht verabreicht werden, weil das Arzneimittel den Honiggeschmack verändern kann.

Nebenwirkungen

Das Bienenvolk kann während der Behandlung leicht unruhig werden.

Verfalldatum

Die Produkte in der Originalpackung ist verwendbar nach der Herstellung vor drei Jahren. nach der Öffnung die direkte Packung müssen Sie sofort verwenden.

Besondere Lagerungshinweise

Nicht über 30°C lagern. Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren. In der Originalverpackung aufbewahren und trocken lagern. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Karton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Die Packung

6 Stücke Streifen sind in einem dreilagige Folio verpackt (PET/Al/PET PPHC), in einem Karton. Der Karton kann man öffnen.

Nur für die Behandlung die Tiere. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder von Abfallmaterialien, sofern erforderlich

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

Hersteller: "Primavet-Sofia" Ltd. Herakovo, Bojuriste, Sofia, 2211, Bulgária

Zulassungsinhaber: **EURO-VET Zöldsziget Kft.** 7500 Nagyatád, Petőfi u. 24.

Zulassungsnummer für das Inverkehrbringen: **069/1/2010 MgSzH ÁTI**